

*Admissions.* — M. Lucien BEAUVALLÉ, 47, rue Belzunce, Paris, 10<sup>e</sup>.  
*Coléoptères.*

— M. Joseph BEQUAERT, docteur ès sciences naturelles, à Paris.  
— *Diptères et Hyménoptères.*

— M. Jean BONDROIT, artiste-peintre, Laboratoire d'Entomologie du Muséum, 55, rue de Buffon, Paris, 5<sup>e</sup>. — *Staphylinides; Formiciles.*

— M. Louis PIERRE, directeur d'École communale, 8, rue Rivay, Levallois-Perret (Seine). — *Entomologie générale.*

*Présentation.* — M. Charles LACREUZE, 27, Coulouvrenière, Genève (Suisse), présenté par MM. le Dr REVERDIN et J. CULOT. — Commissaires-Rapporteurs : MM. Louis DEMAISON et J. DE GAULLE.

*Démission.* — M. Michel TOSSIZZA, à Paris.

*Souscription.* — Sur l'avis du Conseil, la Société s'est fait inscrire comme membre titulaire de la Ligue sanitaire française.

---

## Communications.

### Description d'un nouveau genre de Coléoptères Phytophages de Madagascar.

par Julien ACHARD.

**Bruchomima.** nov. gen. — Tête plus longue que large, brusquement resserrée derrière les yeux, prolongée en avant en un museau assez grand; front convexe, séparé de l'épistome par une dépression transversale; yeux assez gros, subglobuleux, échancrés au bord antérieur; palpes maxillaires grands, leur dernier article acuminé, un peu plus grand que le précédent. Antennes assez robustes, élargies et comprimées à partir du huitième article.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, plus long que large, tronqué droit à la base et au sommet, étranglé latéralement un peu avant la base, puis largement renflé, non épineux.

Élytres allongés, parallèles, arrondis ensemble du sommet.

Planches antérieures et intermédiaires coniques, les premières contiguës, les secondes séparées par un mésosternum très étroit.

Premier segment abdominal n'embrassant pas les épimères; dernier segment le plus grand de tous.

Pattes courtes et très robustes; fémurs fortement renflés; tibias antérieurs droits, les autres, surtout les postérieurs, arqués; tarses épais, leur dernier article long et très grêle; ongles petits, appendiculés.

L'insecte pour lequel ce genre est créé présente assez, au premier abord, l'aspect d'un Bruchide. Ses caractères le rapprochent aussi des Mégalopides; cependant la forme du premier segment abdominal, qui n'embrasse pas les épimères, et les ongles appendiculés empêchent de le classer dans ce groupe. Sa place semble être à côté des *Zeugophora* et *Pedrillia*, dont on le distinguera notamment par la tête prolongée en un museau accentué, le prothorax sans épine au côté externe et sans échanerure aux angles postérieurs, les antennes et les pattes plus robustes, le dernier article des tarses long et grêle.

**Bruchomima chloropelta**, n. sp. — Allongé, subparallèle, pubescent, fauve clair, avec une macule sur le prothorax, une grande tache commune sur le disque des élytres, les pattes et le sommet de l'abdomen vert tendre.

Tête fauve, large, fortement resserrée derrière les yeux; front convexe, ponctué; épistome assez grand, tronqué droit en avant; yeux grands, convexes, assez fortement échanerés en triangle; palpes maxillaires très robustes, avec le dernier article acuminé. Antennes fauves avec les quatre derniers articles noirs; premier article robuste, obconique, deuxième aussi gros mais de moitié plus court, troisième et quatrième allongés et subégaux, les trois suivants un peu plus épais et un peu plus courts, les quatre derniers transverses et légèrement comprimés.

Prothorax un peu plus long que large, étranglé avant la base, puis renflé latéralement, fauve avec une tache ovale vert pâle, au milieu du disque.

Élytres allongés, parallèles, légèrement déprimés entre l'écusson et le calus huméral qui est assez accentué; ponctuation assez forte et régulière; disque couvert d'une grande tache verte commune, ovulaire, entourée d'une couronne de squamules piliformes blanches distinctes de la pubescence générale.

Dessous fauve, plus ou moins enfumé sur la poitrine; dernier segment abdominal et hanches antérieures et intermédiaires verts. Pattes très robustes, vert tendre, sauf le dernier article des tarses et les ongles qui sont noirs.

Long. 3,5 mm.

HAB. Tananarive (coll. J. ACHARD).

---